

Perú – País

Estudio Global de Tabaco en los Jóvenes (GYTS)



HOJA DE REPORTE • • • • • • • •

El GYTS Perú incluye datos sobre la prevalencia del uso de cigarrillos y otros productos del tabaco así como información sobre seis factores determinantes en el uso del tabaco: acceso/ disponibilidad y precio, exposición al humo de tabaco medioambiental (ETS), cesación, conocimientos y actitudes, medios de comunicación y publicidad, y plan de estudios escolar. Estos factores determinantes son componentes que el Perú podría incluir en un programa integral para el control del uso del tabaco. El estudio, realizado a nivel nacional urbano en el año 2003, comprendió estudiantes de 1ro a 5to grado de secundaria. Un plan de muestreo

bietápico fue usado para obtener datos representativos de todos los escolares de varias ciudades del País. En la primera fase, las escuelas se seleccionaron con una probabilidad proporcional al tamaño de la matrícula. En la segunda fase se seleccionaron aulas al azar y todos los estudiantes en las aulas seleccionadas eran elegibles para participar en el estudio. La proporción de la respuesta de las escuelas fue 98,3%, la proporción de respuesta de los estudiantes fue 91,0%, y la tasa de respuesta global fue 89,5%. Un total de 10976 estudiantes participaron en el GYTS Perú.

Prevalencia

- 56,7% de los estudiantes había fumado cigarrillos alguna vez (H=61,9%, M=50,9%)
- 26,2% utilizan actualmente algún producto derivado del tabaco (H=29,9%,M=21,7%)
- 20,9% fuman cigarrillos actualmente (H=24,7%,M=16,4%)
- 7,9% usan actualmente otros productos derivados del tabaco (H=8,1%,M=7,1)
- 23,3% de estudiantes que nunca fumaron podrían comenzar a fumar el próximo año (H=22,9%,M=23,7%)

Conocimientos y actitudes

- 16,0% piensan que los varones que fuman tienen más amigos y 15,7% piensan que las mujeres que fuman tienen más amigos
- 13,3% piensan que los varones que fuman son más atractivos y 12,7% piensan que las mujeres que fuman son más atractivas

Acceso y Disponibilidad - Fumadores Actuales

- 10,4% normalmente fuman en casa
- 64,4% compra los cigarrillos en una tienda
- 79,8% de aquellos que compraron cigarrillos en una tienda NO se les negó la venta en la tienda debido a su edad

El Humo de Tabaco Medioambiental

- 29,5% viven en casas donde otros fuman
- 42,5% están alrededor de otros que fuman en lugares fuera de su casa
- 86,1% piensan que debe prohibirse fumar en lugares públicos
- 54,6% piensan que el humo del cigarrillo que fuman otras personas le hace daño
- 38,8% tienen uno o más padres que fuman
- 16,3% tienen la mayoría o todos sus amigos que fuman

Cesación - Fumadores Actuales

- 71,4% desean dejar de fumar
- 72,8% intentaron dejar de fumar durante el último año
- 64,1% han recibido ayuda para dejar de fumar

Los Medios de Comunicación y la Publicidad

- 89,6% vieron muchos mensajes contra el cigarrillo en los medios de comunicación
- 73,1% vieron muchos mensajes pro fumar cigarrillos en los medios de comunicación
- 78,7% vieron muchos mensajes pro fumar cigarrillos en los periódicos o revistas
- 13,0% poseen un objeto con un logotipo de marca de cigarrillos
- 10,6% recibieron ofertas de cigarrillos gratis de un representante de una compañía de tabaco.

El Colegio

- 48,9% habían recibido información en clase, durante el último año, sobre los peligros de fumar
- 41,4% habían discutido en clase, durante el último año, las razones por las cuales las personas de su edad fuman
- 37,4% habían recibido información en clase sobre los efectos del uso de tabaco

Aspectos resaltantes

- El uso actual de cigarrillos es alto; el uso de otros productos derivados del tabaco es bajo
- Es probable que alrededor de 1/4 de los no-fumadores empiecen a fumar este año
- Mas de la mitad de los estudiantes piensan que el humo de tabaco fumado por otros es peligroso para ellos
- Aproximadamente 9 de cada 10 estudiantes piensan que debe prohibirse fumar en lugares públicos
- La exposición al humo de tabaco ambiental es muy alta, 4 de cada 10 padres fuman
- 7 de cada 10 estudiantes que fuman desean parar de fumar.

Recomendaciones

- Se necesita reforzar la legislación que prohíbe fumar en lugares públicos
- Es necesario un programa de cesación para los jóvenes
- Es necesario que la currícula escolar sobre prevención del uso del tabaco sea accesible a un mayor número de estudiantes

Estudio colaborativo OMS/TFI-CDC-CEDRO



Para obtener información adicional, por favor contacte con:

Alfonso Zavaleta azavaleta@cedro.org.pe